

상록수

| 명칭 및 학명 | 햇빛이 필요한 정도 | 토양 | 개화 | 수분이 필요한 정도 | 성숙기의 높이와 폭 | 가을철 색 | 참고사항 |
|---|--------------|----------------|---------|------------|-----------------------------|-------|--|
| 남부 목련(Southern magnolia) 'Edith Bogue' <i>Magnolia grandiflora</i>  | 충분한 햇빛~일부 그늘 | 모든 종류, 우수한 배수성 | 흰색, 늦봄 | 중간 | 높이 100cm(40') x 폭 40cm(16') | 상록수 | 이 나무는 내구성이 강하고 가장 추위에 강한 목련 중 하나로 간주됩니다. 목련은 뿌리가 연약하여 뿌리가 있는 영역은 과도한 손질을 제한하고 멀치로 뿌리를 보호하십시오. |
| 월계수 목련(Sweetbay magnolia) 'Moonglow' <i>Magnolia Virginiana</i>  | 충분한 햇빛~일부 그늘 | 모든 종류, 우수한 배수성 | 흰색, 초여름 | 중간 | 높이 90cm(35') x 폭 38cm(15') | 상록수 | 이 목련은 항상 습기가 있는 토양을 선호하며 습지에서도 잘 견딥니다. 일단 자리가 잡히면 건조한 기후도 잘 견딥니다. 목련은 뿌리가 연약하여 뿌리가 있는 영역은 과도한 손질을 제한하고 멀치로 뿌리를 보호하십시오. |

Trees for Bellevue

2023년도 나무 목록

| 명칭 및 학명 | 햇빛이 필요한 정도 | 토양 | 개화 | 수분이 필요한 정도 | 성숙기의 높이와 폭 | 가을철 색 | 참고사항 |
|--|--------------|----------------|----|------------|--------------------------------------|-------|--|
| 해안 소나무(Shore pine) <i>Pinus contorta</i>  | 충분한 햇빛 | 모든 종류, 우수한 배수성 | | 낮음 | 높이 115cm(45') x 폭 76cm(30') | 상록수 | 이 소나무 종은 성장이 빠르고 토양 및 양분이 풍부한 환경에 적응력이 우수합니다. PNW에서 소나무는 토종 조류와 작은 포유류에게 매우 귀중한 나무입니다. 어떠한 해안 소나무도 똑같이 자라는 법이 없습니다. 일단 자리가 잡히면 요구되는 수분은 적습니다. |
| 미송(Douglas fir) <i>Pseudotsuga menziesii</i>  | 충분한 햇빛~일부 그늘 | 모든 종류, 우수한 배수성 | | 낮음 | 높이 254~508cm(100~200') x 폭 50cm(20') | 상록수 | Bellevue에서 보게 되는 가장 일반적인 나무입니다. 이것은 진짜 전나무, 소나무, 가문비나무 또는 솔송나무는 아닙니다. 미송은 어릴 때 피라미드 모양이고 자랐을 때 개방적인 구조를 갖는 아름답고, 키가 큰 종입니다. 이 나무는 토종 동물들이 가장 많이 활용하는 나무이며, 껍질은 두껍고 화재에 강하나, 건기에 민감합니다. |

Trees for Bellevue 2023년도 나무 목록

| 명칭 및 학명 | 햇빛이 필요한 정도 | 토양 | 개화 | 수분이 필요한 정도 | 성숙기의 높이와 폭 | 가을철 색 | 참고사항 |
|--|--------------|-----------------------|----|------------|--------------------------------|-------|---|
| 그린 자이언트 측백나무(Green giant arborvitae) <i>Thuja plicata 'Green Giant'</i>  | 충분한 햇빛~일부 그늘 | 모든 종류, 습지대에 어느 정도의 내성 | | 낮음~중간 | 높이 150cm(60') x 폭 50cm(20') | 상록수 | 이 나무는 질병이 없고 가지치기를 통해 보다 작게 유지가 가능한, 강인한 북미산 적삼나무(Western Red Cedar)입니다. 종종 장벽이나 울타리에 사용됩니다. 사슴에도 내성이 있습니다. |
| 북부 스파이어(Northern spire) <i>Thuja plicata 'Northern Spire'</i>  | 충분한 햇빛~일부 그늘 | 모든 종류, 습지대에 어느 정도의 내성 | | 낮음~중간 | 높이 50cm(20') x 폭 15cm(6') | 빨간색 | 이 북미산 적삼나무는 잘 자라고, 매우 강인하며, 유지관리가 손쉬우며, 굳건한 나무입니다. 그룹을 지어 심으면 큰 울타리, 장벽 또는 장애물로 활용할 수 있습니다. 사슴에도 내성이 있습니다. |

낙엽성 나무

| 명칭 및 학명 | 햇빛이 필요한 정도 | 토양 | 개화 | 수분이 필요한 정도 | 성숙기의 높이와 폭 | 가을철 색 | 참고사항 |
|--|--------------|----------------|------------|------------|----------------------------------|---------|---|
| 채진목(Service berry) <i>Amelanchier alnifolia</i>  | 충분한 햇빛~일부 그늘 | 모든 종류, 우수한 배수성 | 흰색 | 중간 | 높이 50cm(20') x 폭 50cm(20') | 빨간색-주황색 | 사스카툰 베리라고 부르는 이 작은 토종 나무는 하늘거리는 꽃잎을 가진 흰색 꽃이 열립니다. 초여름에 익어서 먹을 수 있는 자주색 열매가 자랍니다(충분한 햇빛을 받으면). 열매는 사람이 먹을 수 있으며 또한 야생동물을 끌어들일 수 있습니다. 모양/크기를 관리하기 위해 가지치기가 가능합니다. |
| 카스카라(Casara) <i>Frangula purshiana</i>  | 충분한 햇빛~일부 그늘 | 모든 종류, 습지대에 내성 | 녹색이 감도는 흰색 | 중간~높음 | 높이 35~90cm(15~35') x 폭 75cm(30') | 녹색-흰색 | 이 작은 토종 나무는 가지치기에 따라 덩굴/관목이나 나무의 형태를 가질 수 있으며, 인간에게는 유해하나 토종 조류는 좋아하는 작은 열매를 생산하게 됩니다. 카스카라는 다양한 유형의 토양에도 자랄 수 있는 매우 내성이 강한 종입니다. |

Trees for Bellevue 2023년도 나무 목록

| 명칭 및 학명 | 햇빛이 필요한 정도 | 토양 | 개화 | 수분이 필요한 정도 | 성숙기의 높이와 폭 | 가을철 색 | 참고사항 |
|--|--------------|----------------|----|------------|----------------------------|-------|--|
| 시카고 하디 무화과(Chicago hardy fig) <i>Ficus carica 'Chicago Hardy'</i>  | 충분한 햇빛~일부 그늘 | 모든 종류, 우수한 배수성 | | 중간~높음 | 높이 30cm(12') x 폭 25cm(10') | 노란색 | 늦여름에서 초가을 사이에 익는 달콤한 자주색 열매로, 자가 수정되는 무화과를 생산합니다. 사실상 해충 및 질병이 없음. 수분이 유지될 수 있도록 나무의 생애 동안 멀치를 사용하십시오. 나무는 1~2년 사이에 시작되는 열매 생산 시기에 건조할 때 추가로 수분이 제공된다면 더 많은/더 나은 열매를 생산하게 됩니다. 열매 생산을 위한 양분 제공을 위해 초봄과 여름 중반에 퇴비와 함께 비료를 주십시오. |
| 데저트 킹 무화과(Desert king fig) <i>Ficus carica 'Desert King'</i>  | 충분한 햇빛~일부 그늘 | 모든 종류, 우수한 배수성 | | 중간~높음 | 높이 25cm(10') x 폭 30cm(12') | 암녹색 | 초록색 껍질과 딸기색 과육을 지닌 자가 수정되는 무화과. 날것으로 섭취하기에 뛰어납니다. 봄에 대량의 작물을 생산하고 늦여름에 좀 적게 생산합니다. 나중에 작물 수확을 위해 가벼운 가지치기가 필요합니다. |

Trees for Bellevue 2023년도 나무 목록

| 명칭 및 학명 | 햇빛이 필요한 정도 | 토양 | 개화 | 수분이 필요한 정도 | 성숙기의 높이와 폭 | 가을철 색 | 참고사항 |
|--|------------|----------------|-------|------------|--------------|-------------|---|
| 캐나다 레네트 사과(Canadian reinette apple) <i>Malus Reinette du Canada</i>  | 충분한 햇빛 | 모든 종류, 우수한 배수성 | 흰색, 봄 | 중간~높음 | 높이 35cm(15') | 녹색이 감도는 노란색 | 이 변종 품종은 프랑스에서 1600년대에 처음 재배되었습니다. 나무는 (2~4년 사이에 시작되는) 열매 생산 시기에 건조할 때 추가로 수분이 제공된다면 더 많은/더 나은 열매를 생산하게 됩니다. 수분이 유지될 수 있도록 멀치를 사용하십시오. 열매 생산을 위한 양분 제공을 위해 초봄과 여름 중반에 퇴비와 함께 비료를 주십시오. 황금색의 열매는 늦게 익지만, 급기에 사용하려면 좀 더 일찍 수확할 수도 있고 가을로 접어들며 달콤함이 더해집니다. 수분 요건은 문헌에서 서로 모순됩니다: 일부 출처에선 자가 수정, 일부 출처에선 자가 불임(열매 생산을 위해선 관련이 없는 두 가지의 다른 사과 종 또는 근처에 자가 결과하는 변종이 필요함). |

Trees for Bellevue 2023년도 나무 목록

| 명칭 및 학명 | 햇빛이 필요한 정도 | 토양 | 개화 | 수분이 필요한 정도 | 성숙기의 높이와 폭 | 가을철 색 | 참고사항 |
|---|------------|----------------|--------|------------|-------------------------------|----------------|---|
| 라핀스 체리(Lapins Cherry) <i>Prunus avium</i> 'Lapins'  | 충분한 햇빛 | 모든 종류, 우수한 배수성 | 흰색, 봄 | 중간~높음 | 높이 50cm(20') x 폭 35cm(15') | 빨간색, 주황색 및 노란색 | 이 체리는 유사한 맛을 지닌 Bing 체리의 개량종으로 재배되었습니다. 열매는 모든 사용에서 뛰어나며 6월에서 8월 사이에 익습니다. 수분이 유지될 수 있도록 나무의 생애 동안 멀치를 사용하십시오. 나무는 (3~5년 사이에 시작되는) 열매 생산 시기에 건조할 때 추가로 수분이 제공된다면 더 많은/더 나은 열매를 생산하게 됩니다. 열매 생산을 위한 양분 제공을 위해 초봄과 여름 중반에 퇴비와 함께 비료를 주십시오. 이 나무는 자가 결과하며, 화분 매개자에게 유익하고, 갈라짐 및 줄기마름병에 내성이 있습니다. |
| 돌개회나무(Japanese tree lilac) <i>Syringa reticulata</i> 'Ivory Silk'  | 충분한 햇빛 | 모든 종류, 우수한 배수성 | 흰색, 늦봄 | 중간 | 높이 60cm(25') x 폭 50cm(20') | 녹색-노란색-갈색 | 돌개회나무는 봄에 아름다운 꽃을 피우며 별새와 다른 화분 매개자들을 끌어들이습니다. 가지치기를 통해 큰 덩불이나 나무의 모습을 가질 수 있습니다. 꽃은 만발하며 향취가 있으며 전통적인 라일락보다 훨씬 더 오랜 기간 동안 꽃을 피웁니다. 자리를 잡은 뒤에라도 혹서기에 물을 주십시오. |